

Синехии у девочек

розділ: Загальне здоров'я, дата:
01.05.2018, автор: Буренок А.С. по
материалам emedicine.medscape.com,
www.healthychildren.org



Вход во влагалище окружают малые половые губы. В редких случаях они срастаются и закрывают вход во влагалище частично или полностью. Это состояние называется - сращение малых половых губ, или синехии. Чаще встречается в грудном возрасте после 3 месяцев, реже возникает у детей при наличии воспаления или раздражения этой области, что может быть вызвано "пелёночным" дерматитом, контактом с едкими средствами для стирки или ношением синтетического нижнего белья. Считается, что причиной возникновения синехий является пониженный уровень эстрогена. Защитный эффект материнского эстрогена влияет на то, что синехии крайне редки у девочек до 3 месяцев.

Часто синехии малых половых губ протекают бессимптомно, но иногда могут приводить к трудностям при мочеиспускании или повышать восприимчивость к инфекционным заболеваниям мочевыделительной системы. Если вход во влагалище перекрыт значительно, моча или секрет влагалища скапливаются выше сращения.

Лечение

Обратитесь к педиатру, если Вы заметили, что у вашей дочери влагалище закрыто частично или полностью. Врач проведёт осмотр и сделает вывод, нужно ли лечение или нет. В 80% случаев синехии проходят самостоятельно с возрастом ребёнка и не требуют лечения.

При наличии показаний назначается крем с содержанием эстрогена, который поможет разъединить сращения. Может быть проведено ручное или хирургическое разъединение синехий.

В более тяжёлых случаях необходима консультация уролога.

Прогноз

Прогноз благоприятный. Даже если не лечить синехии, это состояние проходит самостоятельно в период пубертата.

<https://emedicine.medscape.com/article/953412-medi...>

<https://www.healthychildren.org/English/health-iss...>